

Table 3C—Notifiable Diseases in New Zealand for Year Ended 31st December, 1949, Showing Distribution by Age and Sex (Europeans)

Diseases.	0-1.		1-5.		5-10.		10-15.		15-20.		20-25.		25-30.		30-35.		35-40.		40-45.	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Streptococcal sore throat
Diphtheria	4	3	114	119	186	243	69	117	34	34	11	34	9	20	2	12	6	10	4	6
Enteric—	2	1	12	9	17	11	5	3	5	..	5	4	1	1	1	1	..	2	2	..
Typhoid	1	1
Paratyphoid	1
Tuberculosis—
Pulmonary	2	..	9	11	18	11	18	18	80	42	78	132	73	112	40	64	58	58	54	35
Other forms	3	1	20	17	14	16	15	3	16	15	7	15	11	17	10	7	8	5	11	1
Cerebro-spinal meningitis	3	5	5	7	5	1
Poliomyelitis	2	1	22	29	53	39	44	28	21	26	18	11	10	11	3	6	0	3	2	4
Influenza	2	1	2	1	3	1
Erysipelas	2	1	4	2	1	5	3	1	2	2	2	1	4	4	6	6	7	8
Puerperal fever—
Ordinary
Following abortion
Eclampsia
Tetanus	1	..	2	1	4	1	1	..	7	..	5	30	5	11	13	10	8	2	2	3
Typhoid
Typhus
Trachoma
Ophthalmia neonatorum	3	2
Bacterial	1	1	5	6	2	2	3	1	8	9	5	18	3	5	2	5	2	4	2	3
Non-bacterial	2
Bacillary dysentery	3	1	1	1	2	3	41	41	49	..	1	1	14	2	2	2	1	1	1	1
Amoebic dysentery
Undulant fever
Chronic lead poisoning
Malaria
Lethargic encephalitis
Anchylostomiasis (hookworm)
Totals	29	18	200	206	307	334	151	214	226	122	136	273	135	222	98	137	101	104	91	61