

| | |
|-----------------------------|--|
| Podototarin mono-acetate: | <i>Podocarpus nivalis</i> |
| Sugiol: | <i>Podocarpus dacrydioides</i> , <i>P. ferrugineus</i> , <i>P. totara</i> , <i>P. hallii</i> , <i>Dacrydium cupressinum</i> |
| Xanthoperol: | <i>Podocarpus dacrydioides</i> |
| Isopimarolin: | <i>Dacrydium biforme</i> |
| Isopimarinal: | <i>Dacrydium biforme</i> |
| Isopimamic acid: | <i>Podocarpus ferrugineus</i> , <i>Dacrydium kirkii</i> , <i>D. biforme</i> |
| Sandaracopimamic acid: | <i>Agathis australis</i> |
| Abietic acid: | <i>Agathis australis</i> |
| Araucarolone: | <i>Agathis australis</i> |
| Araucarone: | <i>Agathis australis</i> |
| Araucarol: | <i>Agathis australis</i> |
| Araucarenolone: | <i>Agathis australis</i> |
| Podocarpic acid: | <i>Podocarpus dacrydioides</i> , <i>P. nivalis</i> , <i>P. totara</i> , <i>P. hallii</i> , <i>Dacrydium cupressinum</i> |
| Methyl podocarpate: | <i>Podocarpus dacrydioides</i> , <i>P. nivalis</i> , <i>P. totara</i> |
| Pododacric acid: | <i>Podocarpus dacrydioides</i> , <i>P. totara</i> |
| Diterpene oxides: | <i>Agathis australis</i> |
| Phyllocladene: | <i>Podocarpus dacrydioides</i> , <i>P. spicatus</i> , <i>P. ferrugineus</i> , <i>P. nivalis</i> , <i>P. totara</i> , <i>P. hallii</i> , <i>Dacrydium kirkii</i> , <i>D. biforme</i> , <i>D. bidwillii</i> , <i>D. laxifolium</i> , <i>D. cupressinum</i> , <i>D. colensoi</i> , <i>D. laxifolium</i> x <i>intermedium</i> , <i>Phyllocladus alpinus</i> , <i>P. glaucus</i> , <i>P. trichomanoides</i> , <i>Libocedrus plumosa</i> |
| Isophyllocladene: | <i>Araucaria excelsa</i> <i>Podocarpus dacrydioides</i> , <i>P. ferrugineus</i> , <i>P. nivalis</i> , <i>P. hallii</i> <i>Dacrydium kirkii</i> , <i>D. biforme</i> , <i>D. bidwillii</i> , <i>D. cupressinum</i> , <i>D. colensoi</i> , <i>D. laxifolium</i> x <i>intermedium</i> , <i>Phyllocladus alpinus</i> , <i>P. glaucus</i> , <i>P. trichomanoides</i> , <i>Libocedrus plumosa</i> , <i>L. bidwillii</i> <i>Araucaria excelsa</i> |
| (+)-Kaurene: | <i>Podocarpus spicatus</i> , <i>P. ferrugineus</i> , <i>P. nivalis</i> , <i>P. totara</i> , <i>Dacrydium kirkii</i> , <i>D. laxifolium</i> , <i>D. intermedium</i> , <i>Phyllocladus trichomanoides</i> <i>Libocedrus plumosa</i> |
| (—)-Kaurene: | <i>Agathis australis</i> |
| (+)-Isokaurene: | <i>Podocarpus spicatus</i> , <i>P. totara</i> , <i>P. hallii</i> , <i>P. acutifolius</i> , <i>Dacrydium laxifolium</i> , <i>D. intermedium</i> , <i>Libocedrus plumosa</i> |
| (—)-Isokaurene: | <i>Agathis australis</i> |
| Cupressene (hibaene): | <i>Podocarpus dacrydioides</i> , <i>P. spicatus</i> , <i>P. ferrugineus</i> , <i>P. nivalis</i> , <i>Dacrydium kirkii</i> , <i>D. laxifolium</i> , <i>D. intermedium</i> , <i>D. laxifolium</i> x <i>intermedium</i> , <i>Agathis australis</i> |
| Diterpene (?), m.p. 53–55°: | <i>Libocedrus bidwillii</i> |

STEROLS

| | |
|---------------|---|
| β-Sitosterol: | <i>Podocarpus nivalis</i> , <i>P. totara</i> , <i>Dacrydium biforme</i> , <i>D. cupressinum</i> <i>Agathis australis</i> |
|---------------|---|